

Анкета-вопросник для родителей при подозрении снижения слуховой функции ребенка

1. Вздрагивает ли ребенок на громкие звуки в возрасте 2-3 недель?
2. Замирает ли ребенок при звуке голоса в возрасте 2-3 недель?
3. Беспокоится ли ребенок при громких звуках?
4. Поворачивает ли малыш голову в возрасте 4 месяцев в сторону звучащей игрушки или голоса?
5. Оживляется ли ребенок на голос матери в возрасте 1-3 месяца, не видя ее?
6. Реагирует ли малыш в возрасте 1,5-6 месяцев криком или широким открыванием глаз на резкие звуки?
7. Гулит ли ребенок в возрасте 2-4 месяцев? Эти звуки монотонные или интонационно окрашенные?
8. Переходит ли у ребенка гуление в лепет (появление слогов *ба, па, ма* и их последовательностей) в возрасте 4-6 месяцев?
9. Появляется ли эмоциональный лепет на появление родителей?
10. Появляются ли у ребенка новые слоги в возрасте 8-10 и месяцев*
11. Поворачивается ли ребенок на свое имя в возрасте старше 6-7 месяцев?
12. Понимает (выполняет) ли ребенок простые просьбы в возрасте 8-10 месяцев («Где мама?», «Дай мячик» и т.д.).
13. Появляются ли у ребенка слова в возрасте одного года?
14. Появляются ли у ребенка двухсловные фразы в возрасте 1,5-2 года?
15. Старается ли ребенок старше 2 лет смотреть на лицо говорящего с ним человека при общении?

Оценка результатов: при отрицательных ответах на вопросы 1-14 и положительном ответе на вопрос 15 может быть заподозрено снижение слуха или нарушение слухового восприятия. В этом случае рекомендуется пройти комплексное обследование слуха с использованием объективных методов.